



郭綜合醫院 點耳藥水注意事項

1. 用藥前，先將雙手洗乾淨。



2. 搖動藥水瓶，使藥水均勻，並檢視藥物有無過期或變色，藥物如有冷藏須先回溫，以免藥水溫度與體溫相差太大時，會產生短暫之眩暈感。



3. 滴藥前，先清潔外耳道，減少分泌物。



4. 側躺或傾斜患耳朝上，為了使藥流入耳內，成人要將耳朵往上後方拉，小孩要往下後方拉，可促使藥液往內流，保持相同姿勢約5分鐘。




成人往上往後拉



小孩往下往後拉

- 5.點耳藥水次數、劑量請依醫師指示使用。
- 6.自外耳孔滴入藥水 2~3 滴，滴管不可插入耳內，避免造成污染。



依醫囑滴入耳藥水

- 7.讓藥水在耳內浸泡 10 分鐘，此時可輕微壓放耳道(耳珠)數次，10 分鐘後後將頭斜傾，使藥水自然流出，再擦掉流出之藥水即可，耳內不要擦拭。



輕壓耳珠
讓藥水流入



10 分鐘後將頭斜傾
讓藥水自然流出

- 8.給藥後耳道癢或有燒灼感，應告訴醫師或回診檢查。
- 9.滴藥時，滴嘴不要直接接觸耳朵，以保持耳朵暢通；滴藥後，不要立即將棉棒伸進耳朵內以免吸乾藥水。



滴嘴勿接觸耳朵



勿將棉棒伸進耳朵內
以免將藥水吸乾

- 10.不要用清水清洗滴嘴，只要用衛生紙擦拭乾淨即可。



滴嘴勿沖水