




郭綜合醫院 各種管路照顧注意事項

各位住院病人及家屬，因病人身上有留置管路，請您協助配合下列注意事項：

一、靜脈導管之作用：輸注點滴，注意事項如下：

1. 由護理人員每四天更換靜脈導管注射的部位。
2. 保持輸注的點滴瓶高於病人的注射部位，以防回血，導致管路阻塞。
3. 當發現點滴管路中有回血，請先將點滴瓶提高，注射部位放低，以利血液回流體內。
4. 當發現點滴不滴或注射部位紅腫熱痛，請立即通知護理人員處理。



二、鼻胃管之作用：不能由口進食的病人予以灌食，並協助家人學會灌食方法及注意以下事項：

1. 灌食前務必先反抽鼻胃管，以評估消化情形，如有反抽出50ml以上胃內容物，則表示消化未完全，需將抽出之胃內容物灌回。若抽出的液體為咖啡色或紅色液體，請立即通知護理人員。
2. 灌食時須保持抬高床頭30-60度，以防嗆到。
3. 待食物或藥物灌完後，再抽30ml溫開水，沖淨鼻胃管內殘留物。
4. 灌食後仍須保持床頭抬高30-60分鐘，防胃食道逆流。
5. 注意鼻胃管或膠帶是否有鬆脫或滑脫。
6. 管路固定：在鼻胃管清潔後，確認管路位置是否滑脫。必須先檢查管路的位置正確後，再用別針將管路固定於衣服上，千萬不要固定在床單或枕頭上，以免翻身或坐起時忘了移動鼻胃管，而導致鼻胃管脫落。



三、中心靜脈導管之作用：輸注點滴，注意事項如下：

1. 由護理人員每三天或視情況消毒管路並適當的固定，以防止導管脫落。
2. 請保持點滴瓶高於病人的施打部位，以防回血，導致管路阻塞。
3. 當發現點滴管路中有回血，請先將點滴瓶提高，注射部位放低，以利血液回流體內。
4. 當紗布潮濕、固定的膠帶鬆脫、防水膠布脫落、點滴不滴或縫線脫落時，請立即通知護理人員處理。

