

子宮頸癌

演講者：陳奕廷 醫師

112/03/10

子宮頸癌
是啥米？

我甘仔得
子宮頸癌？

有辦法預
防嗎？



十大死因

1 惡性腫瘤(癌症)

2 心臟疾病

3 肺炎

4 腦血管疾病

5 糖尿病

6 事故傷害

7 慢性下呼吸道疾病

8 高血壓性疾病

9 腎炎、腎病症候群及
腎病變

10 慢性肝病及肝硬化

子宮頸癌這麼可怕

年齡層

35~45y

發生率

NO.9




死亡率

NO.8

台灣每年約有1500名新發生個案，
並導致約640名婦女死亡




什麼是子宮頸癌



誰是高危險群



妊娠次數高



免疫力低下



過早性關係
多重性伴侶



吸煙



家族史


人類乳突病毒 (HPV, Human Papillomavirus)

- 子宮頸癌的主因之一




- 感染途徑：性行為，血體液感染，少數經懷孕與生產途徑

人類乳突病毒 (HPV, Human Papillomavirus)




症狀

無症狀



腹痛、壓迫感
或有殘尿、血尿



異常分泌物



坐骨神經痛
或下肢腫痛




性交後出血
非經期出血
更年期後出血

早期診斷及預防 > 治療



怎麼預防



子宮頸抹片



HPV疫苗



安全性行為

 6分鐘護一生

愛護健康 守護家人
定期篩檢 異常追蹤



六分鐘 護一生

定期做子宮頸抹片與
乳房X光攝影檢查



誰需要做

- 有性經驗的女性都要!!!
- 30歲以上健保補助每年一次
 - 30歲以上每三年至少做一次
- 高危險族群強烈建議每年一次
 - 曾有愛滋病毒或人類乳突病毒感染
 - 曾有過性病
 - 本人或配偶對象複雜


定期抹片檢查，
可降低60-90%
子宮頸癌發生率



抹片檢查怎麼做



擴陰器置入陰道



以小木棒或小刷子在子宮頸上刮取細胞，塗抹於玻片上固定




染色後，透過顯微鏡檢查是否有癌細胞

檢查前要注意

避免盆浴



不要沖洗陰道



勿放置塞劑



前一夜不要
有性行為



避開月經期間




檢查結果

正常	定期抹片檢查(至少三年一次)
意義未明的 非典型細胞變化*	3-6個月後再做抹片檢查，或做HPV檢測、 陰道鏡檢查*
輕度癌前病變	3-6個月後再做抹片檢查，或陰道鏡檢查
重度癌前病變	陰道鏡檢查，切片/錐狀切除
侵襲癌	陰道鏡檢查，切片/錐狀切除或子宮根除手術

異常，
不代表得癌症，
重點是趕快去找醫師。



我來了





人類乳突病毒疫苗

疫苗比較

疫苗名稱	保蓓(二價) Cervarix		嘉喜(四價) Gardasil		嘉喜9(九價) Gardasil 9	
適用對象	9-14歲； 女性	15歲以上； 女性	9-13歲； 女性	14-45歲女性 9-26歲男性	9-14歲 女性及男性	15-26歲 女性及男性
接種劑數	2劑*	3劑	2劑*	3劑	2劑*	3劑
第1劑	第0個月		第0個月		第0個月	
第2劑	第1劑後 6個月	第1劑後 1個月	第1劑後 6個月	第1劑後 2個月	第1劑後6 個月	第1劑後 2個月
第3劑	X	第1劑後 6個月	X	第2劑後 4個月	X	第2劑後 4個月
預防 型別	HPV第16、18型		HPV第6、11、16、18型		HPV第6、11、16、18、 31、33、45、52和58型	

疫苗比較

疫苗名稱	保蓓(二價) Cervarix		嘉喜(四價) Gardasil		嘉喜9(九價) Gardasil 9	
適用對象	9-14歲； 女性	15歲以上； 女性	9-13歲； 女性	14-45歲女性 9-26歲男性	9-14歲 女性及男性	15-26歲 女性及男性
接種劑數	2劑*	3劑	2劑*	3劑	2劑*	3劑
第1劑	第0個月		第0個月		第0個月	
第2劑	第1劑後 6個月	第1劑後 1個月	第1劑後 6個月	第1劑後 2個月	第1劑後6 個月	第1劑後 2個月
第3劑	X	第1劑後 6個月	X	第2劑後 4個月	X	第2劑後 4個月
預防 型別	HPV第16、18型		HPV第6、11、16、18型		HPV第6、11、16、18、 31、33、45、52和58型	

誰需要打疫苗




9~26歲男性及女性

台南市二價公費疫苗：
107 & 106 學年度之
國一女生(含自學)

15歲以上接種三劑

超過26歲仍可施打，
但無法申請藥害救濟

誰不能打疫苗



懷孕婦女



計畫懷孕



疫苗過敏



特殊病史

子宮頸癌或癌前期
免疫力低下者

接種後的副作用

2.6

1000

1

常見副作用為：
注射部位疼痛、腫脹、
紅斑、搔癢、發燒、
頭痛、噁心、暈眩等。



暈眩

發燒

噁心

2

少見的副作用為：
腹瀉、皮疹、蕁麻疹、
關節痛、昏厥等。





打完疫苗是不是就不會
得子宮頸癌？

疫苗只降低部分型別病
毒感染發生率，無法百
分之百預防子宮頸癌





打完疫苗是不是就不用
做子宮頸抹片檢查？

疫苗不能取代抹片，
接種疫苗後仍須
定期接受抹片檢查





打完疫苗能保護
我一輩子嗎？

因目前追蹤受試者的
時限約12年，所以
尚無法證實可維持
多長的保護效期





如果已經有性行為
或是感染病毒，
還可以接種疫苗嗎？

可以。
施打疫苗仍可以預防受
到其他型別的病毒感染。





疫苗可以治療菜花或是
子宮頸癌嗎？

HPV疫苗是預防性疫苗






接種時懷孕怎麼辦？


目前沒證據顯示會對
媽媽或胎兒有害，
不需終止懷孕，
但後續劑量等產後再打




預防子宮頸癌有三寶



子宮頸抹片



HPV疫苗



安全性行為