



子宮頸癌防治

112/08/11

報告人：張互沛、嚴怡婷

什麼是子宮頸癌？

通常是經由「性行為」
感染了「人類乳突病毒」



為什麼子宮頸癌重要？


- 發生率：109年台灣女性10大癌症發生率第**10**名
- 死亡率：111年台灣女性10大癌症死亡率第**8**名



資料來源：本署癌症登記資料(不含原位癌)


子宮頸癌症狀

- 早期：大多**無**症狀
- **不正常陰道出血**：
性交後、兩次經期間、
停經後的出血
- **異常分泌物**：
白帶增加、有臭味、
夾雜血絲
- **腹痛**
- **經期長、量多**




風險因子

- 感染人類乳突病毒(HPV)
- 性行為
 - 較早、較多
- 年齡（好發於35~45）
- 吸菸
- 免疫力差



如何預防？

- 安全性行為
- 接種人類乳突病毒(HPV)疫苗
- 定期做子宮頸抹片



資料來源：天主教仁德醫療財團法人仁德醫院


接種人類乳突病毒(HPV)疫苗

疫苗類型	保蓓（二價）	嘉喜（四價）	嘉喜（九價）
預防病毒類型	高風險致癌型 HPV第16、18型	低風險致癌 HPV第6、11型 高風險致癌 HPV第16、18型	低風險致癌 HPV第6、11型 高風險致癌 HPV第16、18、31、33、45、52、58型
效力持續時間	9~10年	12年以上	6年
接種費用 國一女生可接受公費施打	3000~3500元/劑	每劑3000~3500元/劑 此劑型已停產	5000~6000元/劑
建議施打時程	♀ 9~14歲 打2劑，第2劑間隔5~13月內接種 ♀ 15歲以上 打3劑，1、2劑隔1個月；2、3劑隔5個月	♀ 9~13歲 打2劑，第2劑間隔6~12個月內接種 ♂ 9~26歲 ♀ 14~45歲 打3劑，1、2劑隔2個月；2、3劑隔4個月	♂ 9~14歲 ♀ 9~14歲 打2劑，第2劑間隔6~12個月接種 ♂ 15~45歲 ♀ 15~45歲 打3劑，1、2劑隔2個月；2、3劑隔4個月

子宮頸抹片為什麼重要？

早期發現
早期治療

“癌前病變”



誰需要做子宮頸抹片檢查？

建議所有**30歲以上**曾有性行為的婦女**每三年**至少做一次子宮頸抹片檢查



問：如果很久沒有性生活或已經停經的話，還需要定期做抹片檢查嗎？



需要！

要準備什麼去做檢查呢？

國民健康署補助**30歲以上婦女免費**子宮頸抹片檢查，符合資格者只要**攜帶健保卡和身份證**至健保醫院診所，就可接受篩檢服務。

檢查前一定要注意：

不要
沖洗陰道

避免
盆浴

勿放置
塞劑

前一夜不要
有性行為

避開月經
期間

子宮頸抹片異常時怎麼辦？

子宮頸抹片異常**不代表已經患有癌症**，醫師會做進一步的陰道鏡檢查及切片來確認。



正常	定期抹片檢查(至少三年一次)
意義未明的 非典型細胞變化*	3-6個月後再做抹片檢查，或做HPV檢測、 陰道鏡檢查*
輕度癌前病變	3-6個月後再做抹片檢查，或陰道鏡檢查
重度癌前病變	陰道鏡檢查，切片/錐狀切除
侵襲癌	陰道鏡檢查，切片/錐狀切除或子宮根除手術

子宮頸病變的治療

- 子宮頸抹片檢查結果如為癌前病變，大部份只需要簡單的門診手術即可治癒
- 若經切片證實為癌症，只要發現得早，治癒率也很高

及時發現、及早接受治療，多會有相當樂觀的結果！



一起提醒自己與身邊的人：

- **30歲以上定期接受子宮頸抹片檢查**
- **當身體出現任何異狀時，請盡快就醫檢查**



和我們一起守護自己的健康吧！

