

為什麼您的醫生會建議接種疫苗

1. 近年來肺炎鏈球菌對許多抗生素已產生高度抗藥性，在感染後的抗生素治療效果變差，因此疾病的預防就更加的**重要**。
2. 許多健康的生活方式都可增加抵抗力，而疫苗施打更可以直接針對疾病產生大量的保護力(抗體)。
3. 台灣公共衛生政策在提供新生兒施打多項疫苗後，顯著減少各項感染疾病的發生，疫苗施打對於疾病預防的效果十分明顯。
4. 肺炎鏈球菌感染所導致的疾病是目前可用疫苗預防的疾病中，造成全球死亡人數最多的疾病。



基本資料

年齡：

性別：☐1.男 ☐2.女

教育程度：☐1.研究所 ☐2.大學/專科 ☐3.高中/職 ☐4.國中 ☐5.小學

居住地：☐1.高雄市 ☐2.屏東縣/市 ☐3.其他

六：目前建議接受肺炎鏈球菌疫苗施打的對象和方式是什麼呢？

13價結合型疫苗 (PCV-13)

1. 50-64歲的高危險族群*，建議接種1劑
2. 滿65歲以上者，建議接種1劑

23價多醣體疫苗

1. 滿65歲以上者，建議接種1劑
2. 滿75歲以上未曾接種者可公費接種1劑

*高危險族群的定義：

- 有肺炎病史



- 肝、腎、心(包括心衰竭)、肺(包括氣喘及慢性阻塞性肺病)等慢性疾病



- 糖尿病

- 腦血管疾病/中風、失智症

- 癌症



- 先天或後天免疫功能不全、脾臟切除、器官移植者

- 吸菸者

- 腦脊髓液滲漏



建議施打方式：先接受一劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗注射，一年後再接受一劑23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗注射



七：什麼對您比較重要

您本身的感覺與醫學數據的客觀效果上一樣重要。

接下來請想想什麼對您比較重要。

肺炎一旦發生對健康有
很大的威脅，我希望盡
可能避免它發生

☐ 偏向左 ☐ 中立 ☐ 偏向右

目前身體健康狀況良好
，得到肺炎不太有可能

我認為疫苗會有明顯預
防疾病的效果而且副作
用發生的機會不高

☐ 偏向左 ☐ 中立 ☐ 偏向右

我非常擔心疫苗會有副
作用

我願意負擔額外的費用
以取得對於肺炎更好的
預防效果

☐ 偏向左 ☐ 中立 ☐ 偏向右

我認為額外的費用負擔
對於肺炎預防並不會帶
來相等的效果

八：您是否已經清楚知道接受肺炎鏈球菌疫苗施打的好處與風險了呢？

請試著回答下列問題

接種肺炎鏈球菌疫苗後，我就絕對不會得到肺炎鏈球菌感染症。

- ☐ 是
- ☐ 否(沒有任何一項方式能將感染風險降為零)
- ☐ 我不確定

13價結合型肺炎鏈球菌疫苗與23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗只能二選一。

- ☐ 是
- ☐ 否(可以選擇兩個疫苗都接種，但需間隔一年)
- ☐ 我不確定

若您在上述問題勾選「我不確定」這個選項，請與您的醫護人員進行諮詢。



九：您準備好做決定的嗎？

經過這份表單的介紹，您已經花了一些時間了解肺炎鏈球菌疫苗的資訊以及您考量的因素，現在決定好預防疾病的方法了嗎？


1. 我清楚知道有那些預防肺炎的選擇 ☐知道 ☐不知道
2. 我清楚知道不同預防肺炎的方式分別有什麼好處與壞處 ☐知道 ☐不知道
3. 我已經有足夠的資訊去選擇適合自己的預防肺炎方法 ☐知道 ☐不知道
4. 在您做決定前，您還需要什麼？
 - ☐我已經準備好接受疫苗注射了
 - ☐我想要再多了解肺炎鏈球菌疫苗
 - ☐我需要和家人或朋友再討論看看
5. 您對於自己的決定是否確定呢？
 - ☐非常確定
 - ☐稍微不確定
 - ☐完全不確定

我還有問題想與醫師進一步討論：

非常感謝您的填寫，煩請您將表單投入院長信箱、交給志工服務台或護理師
如需進一步諮詢服務需求，請攜帶此表單至家醫科門診，與醫師共同討論適合您的
預防疾病方式

再次祝福您身體健康！





愛肺一針

肺炎是一種肺部感染性疾病，由細菌或病毒透過空氣或飛沫感染肺部造成發炎，常見症狀包括發燒、咳痰、呼吸急促或呼吸困難、胸痛等，可能進一步導致敗血症，造成生命的威脅。

什麼是肺炎鏈球菌

最常見造成肺炎的細菌，也可能造成中耳炎、鼻竇炎及支氣管炎，嚴重甚至會導致如腦膜炎等感染。主要傳染方式是由帶菌者咳嗽或打噴嚏造成飛沫傳染、與患者親密接觸和觸摸被細菌污染的物品。

接種疫苗有什麼風險



預防方法



關於肺炎鏈球菌疫苗

接種疫苗能直接讓身體產生抗體，讓人體具備抵抗力去避免細菌感染。

在台灣共有兩種肺炎鏈球菌疫苗，分別為13價結合型疫苗與23價多醣體疫苗。

疫苗接種對象

13價結合型疫苗(PCV-13)

1. 50-64歲的高危險族群*，建議接種1劑
2. 滿65歲以上者，建議接種1劑

23價多醣體疫苗


1. 滿65歲以上者，建議接種1劑
2. 滿75歲以上未曾接種者可公費接種1劑

* 高危險族群的定義：

- 有肺炎病史
- 肝、腎、心(包括心衰竭)、肺(包括氣喘及慢性阻塞性肺病)等慢性疾病
- 糖尿病
- 腦血管疾病/中風、失智症
- 癌症
- 先天或後天免疫功能不全、脾臟切除、器官移植者
- 吸菸者
- 腦脊髓液滲漏

建議施打方式：先接受一劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗注射，一年後再接受一劑23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗注射

為什麼醫生會建議接種疫苗



65歲以上者，每次肺炎住院

費用：高達10萬↑

施打新型肺炎疫苗可降低醫療成本支出！



什麼對您比較重要

接種疫苗


- 希望盡可能避免肺炎發生
- 疫苗有預防效果而且副作用發生機會低
- 因為身體狀況不斷變化，希望能多一分保障
- 願意負擔額外費用以取得更好的預防效果

不接種疫苗

- 身體很健康，不太可能得肺炎
- 非常擔心疫苗會有副作用
- 藉由健康的生活就能有效預防肺炎
- 認為額外費用並不會帶來相等的預防效果



掃描進行更多自我評估
需要更多資訊，請至家醫科門診




愛肺一針

肺炎是一種肺部感染性疾病，由細菌或病毒透過空氣或飛沫感染肺部造成發炎，常見症狀包括發燒、咳痰、呼吸急促或呼吸困難、胸痛等，可能進一步導致敗血症，造成生命的威脅。

什麼是肺炎鏈球菌

最常見造成肺炎的細菌，也可能造成中耳炎、鼻竇炎及支氣管炎，嚴重甚至會導致如腦膜炎等感染。主要傳染方式是由帶菌者咳嗽或打噴嚏造成飛沫傳染、與患者親密接觸和觸摸被細菌污染的物品。

接種疫苗有什麼風險



預防方法




關於肺炎鏈球菌疫苗

接種疫苗能直接讓身體產生抗體，讓人體具備抵抗力去避免細菌感染。
在台灣共有兩種肺炎鏈球菌疫苗，分別為13價結合型疫苗與23價多醣體疫苗。

疫苗接種對象

過去疾病史	有肺炎病史者	慢性阻塞性肺病(COPD)	氣喘
與肺炎發生的相關性	曾經有肺炎感染過的人，表示肺部保護力較不佳，再次肺部感染的機會十分的高，而65歲以上族群如果罹患肺炎，在1年內的死亡率高達22.4%。	細菌感染是最常造成疾病急性惡化的主要原因，而最常見的細菌感染就是肺炎鏈球菌。	呼吸道感染也常是造成氣喘的急性惡化主因，最常見的細菌菌種為肺炎鏈球菌，佔其他菌種約50%。
造成肺炎的機率	曾經發生過肺炎感染的病患再度發生肺炎而需要住院的機院率為32%，意即 每100人有32人 會因為肺炎感染而再次住院。	有慢性阻塞性肺疾病的病患感染肺炎的機會是一般人的 7.7倍	有氣喘疾病史的病患感染肺炎的機會是一般人 5.9倍

為什麼醫生會建議接種疫苗



65歲以上者，每次肺炎住院費用：**高達10萬↑**
施打新型肺炎疫苗可降低醫療成本支出！

什麼對您比較重要

接種疫苗

- 希望盡可能避免肺炎發生
- 疫苗有預防效果而且副作用發生機會低
- 因為身體狀況不斷變化，希望能多一分保障
- 願意負擔額外費用以取得更好的預防效果

不接種疫苗

- 身體很健康，不太可能得肺炎
- 非常擔心疫苗會有副作用
- 藉由健康的生活就能有效預防肺炎
- 認為額外費用並不會帶來相等的預防效果



掃描進行更多自我評估
需要更多資訊，請至胸腔內科門診

