



# 我是賀爾蒙治療失效後的轉移性攝護腺癌病人，我該選擇新一代口服賀爾蒙藥物還是化學治療？



當醫師診斷您有轉移性攝護腺癌，  
您已接受過傳統賀爾蒙治療但效果不佳...



代表您現在需要進一步思考要使用  
化學治療 或是 新一代口服賀爾蒙

本表單協助您了解不同治療之間的差異，兩類藥物都能增加存活時間，但其副作用及對生活品質影響不同。透過表單幫助您和您的醫師討論，依自己需求及在意的事情做選擇。


## ✓攝護腺癌

- 好發於**60歲**以上男性
- 國人十大癌症第**4**名



## ✓攝護腺癌症狀

- 1 夜尿
- 2 斷斷續續的尿
- 3 血尿或精液帶血
- 4 尿尿有灼燒感



## ✓賀爾蒙治療失效後的轉移性攝護腺癌

癌細胞跑轉移至淋巴、骨頭、或其他器官時，就稱為轉移性攝護腺癌，此時通常會以傳統賀爾蒙治療，但治療後如果疾病持續惡化，則進展為賀爾蒙治療失效後的轉移性攝護腺癌

## ✓ 適用對象：(需同時符合以下條件)



賀爾蒙治療失效後的轉移性攝護腺癌



尚未接受過化學治療



日常體能狀態佳，沒症狀或僅輕微症狀

## ✓ 不接受任何治療.....

如果不接受任何治療，則可能無法延緩腫瘤惡化、功能退化以及轉移到其他器官出現不同的症狀，包括：

血尿

尿路阻塞

腎臟水腫

骨骼疼痛

骨折


.....

等



在高齡社會，與老化相關的攝護腺癌需要更加重視！

# ✓ 決策地圖



## ✓ 該選擇什麼藥呢？









歐洲紫杉醇



新一代口服賀爾蒙  
澤珂、安可坦



## ✓ 醫療選項簡介

	歐洲紫杉醇	澤珂	安可坦
給藥方式			
用法用量	 /2-3週	 每天早餐前空腹4顆	每天定時服用4顆
		 每天早晚餐後  各1顆類固醇	
價格	健保給付	有條件的健保給付 	



您目前比較想要選擇的方式是？







- 化學治療-歐洲紫杉醇
- 新一代口服賀爾蒙-澤珂
- 新一代口服賀爾蒙-安可坦

目前還不清楚？



請透過以下**5個步驟**來幫助您做決定！













# 1. 治療選項比較

	化學治療	新一代口服賀爾蒙	
	歐洲紫杉醇	澤珂	安可坦
用法 	 /2-3週	每天早餐前空腹 服用 <b>4</b> 顆 + 早晚餐後 各 <b>1</b> 顆類固醇	每天定時 服用 <b>4</b> 顆
價格	健保給付	有條件的健保給付 <sup>註</sup>	
延長 生命 	 增加 <b>3-11</b> 個月	 增加 <b>4</b> 個月	 增加 <b>4</b> 個月
比較三個選擇的「延長生命」沒有明顯差異			

**註** 健保給付前需要先審查，符合條件通過後才能以健保方式給付。如需詳細條件內容請參照健保署藥品給付規定(第九節抗腫瘤藥物)(如右條碼)，或與醫療人員討論。



## 2.副作用比較

共同 副作用 (發生機率)	化學治療	新一代口服賀爾蒙	
	歐洲紫杉醇	澤珂	安可坦
 疲勞	 <b>53-81%</b>	 <b>39%</b>	 <b>24-51%</b>
 腹瀉	 <b>23-78%</b>	 <b>18-22%</b>	 <b>12-22%</b>
 水腫	 <b>7-67%</b>	 <b>25-27%</b>	 <b>12-15%</b>

	化學治療	新一代口服賀爾蒙	
	歐洲紫杉醇	澤珂	安可坦
個別副作用 (發生機率)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•白血球減少 84~99%</li> <li>•貧血 67~97%</li> <li>•肝功能異常 4~19%</li> <li>•掉髮 56~98%</li> <li>•嘔吐 22~67%</li> <li>•甲溝炎 8~41%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•低血鉀 17~30%</li> <li>•高血壓 9~37%</li> <li>•肝功能異常 11~42%</li> <li>•便秘 23%</li> <li>•心律不整 7%</li> <li>•腎上腺功能不全 &lt;1%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•關節痛 21%</li> <li>•高血壓 8~14%</li> <li>•癲癇 1~2%</li> <li>•便秘 9~23%</li> <li>•可逆性後腦病變 &lt;1%</li> </ul>



### 3.您對於醫療方式的考量?

請圈選分數

考量項目	不在意 <span style="margin-left: 100px;">→</span> 非常在意					註:如果您非常在意這件事,建議您可以考慮選擇的方案
	1分	2分	3分	4分	5分	
需定時回醫院施打藥物	1分	2分	3分	4分	5分	安可坦 或 澤珂
需每天吃藥	1分	2分	3分	4分	5分	歐洲紫杉醇
增加癲癇風險	1分	2分	3分	4分	5分	歐洲紫杉醇 或 澤珂
擔心傷肝	1分	2分	3分	4分	5分	安可坦
增加感染、甲溝炎、嘔吐風險	1分	2分	3分	4分	5分	安可坦 或 澤珂
需記得空腹吃藥	1分	2分	3分	4分	5分	歐洲紫杉醇 或 安可坦
擔心花費	1分	2分	3分	4分	5分	如符合健保給付規定,三種藥物皆有給付

## 4.對於上面提供的資訊， 您是否已經了解呢？

請在選項前方框框內打✓

1.	化療與新一代口服賀爾蒙延長生命效果差不多。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定 😊 😞 ?
2.	化療需每二至三週回醫院施打。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定 😊 😞 ?
3.	澤珂須注意空腹吃，並且早晚服用1顆類固醇。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定 😊 😞 ?
4.	安可坦比較不會傷肝，但有癲癇方面風險。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定 😊 😞 ?
5.	常見副作用疲勞、水腫、腹瀉，化療相對發生率較高。	<input type="checkbox"/> 對 <input type="checkbox"/> 不對 <input type="checkbox"/> 不確定 😊 😞 ?

## 5.您現在確認好醫療方式了嗎？

請在選項上方框框內打✓



# 如果您目前還無法決定， 請告訴我們原因

( 已完成決定者請略過此頁 )

請在選項前方框框內打✓

- 我想要再與我的主治醫師討論我的決定。
- 我想要再與其他人 ( 包含配偶、家人、朋友或第二意見提供者... ) 討論我的決定。
- 對於以上治療方式，我想要再瞭解更多，我的問題有： \_ \_ \_ \_ \_
- 不進行任何治療，原因： \_ \_ \_ \_ \_

完成以上評估後，您可以列印及攜帶此份結果與您的主治醫師討論。



瞭解更多資訊及資源：

台灣泌尿科醫學會  
泌泌基地



台灣楓城泌尿醫學會  
攝護腺癌衛教文章

